

## H-XELOX(ハーセプチン・ゼローダ・エルプラット)療法

| H-XELOX療法の投与スケジュール |                                                         |     | 3週間  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|
|                    | 1日目                                                     | 8日目 | 15日目 |
| ハーセプチン（注射）         | ●                                                       |     |      |
| エルプラット（注射）         | ●                                                       |     |      |
| ゼローダ（内服）           | 1日2回 1000mg/m <sup>2</sup> /回<br>2投1休<br>(14日間服用、7日間休薬) |     |      |

3週間ごとに繰り返します。

制吐対策(中等度催吐性リスク)

1日目 カイトリル注、デカドロン注

※中等度催吐性リスクのため、オプションで主治医の判断によっては、イメンドカプセルもしくはプロイメンド注やデカドロン錠が追加される場合もあります。

※ゼローダの投与量(C法)

体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後30分以内に1日2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

| 体表面積                                        | 1回用量    |
|---------------------------------------------|---------|
| 1.36m <sup>2</sup> 未満                       | 1,200mg |
| 1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満 | 1,500mg |
| 1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満 | 1,800mg |
| 1.96m <sup>2</sup> 以上                       | 2,100mg |