

# オプジーボ+XELOX(ゼローダ・エルプラット)療法

オプジーボ+XELOX 療法の投与スケジュール		3週間		
	1日目	8日目	15日目	
オプジーボ (注射)	●			
エルプラット (注射)	●			
ゼローダ (内服)		1日2回	1000mg/m <sup>2</sup> /回	
		2投1休		
		(14日間服用、7日間休薬)		

3週間ごとに繰り返します。

制吐対策 (中等度催吐性リスク)

1日目 カイトリル注、デカドロン注

※内服薬のイメンドカプセルやデカドロン錠などは、主治医の裁量によって処方される場合があります。

## ※ゼローダの投与量

体表面積にあわせて次の投与量を朝食後と夕食後 30 分以内に 1 日 2 回、14 日間連日経口投与し、その後 7 日間休薬する。これを 1 コースとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

体表面積	1 回用量
1.36m <sup>2</sup> 未満	1,200 mg
1.36m <sup>2</sup> 以上 1.66m <sup>2</sup> 未満	1,500 mg
1.66m <sup>2</sup> 以上 1.96m <sup>2</sup> 未満	1,800 mg
1.96m <sup>2</sup> 以上	2,100 mg