

## SP(S-1・シスプラチン)療法(5週毎)

SP療法の投与スケジュール		5週間
	1日目	8日目 15日目…
シスプラチン (注射)		●
S-1 (内服)	1日2回	40mg/m <sup>2</sup> /回 3投2休 (21日間服用、14日間休薬)

5週間ごとに繰り返します。

制吐対策(高度催吐性リスク)

8日目 カイトリル注、デカドロン注、イメンドカプセル125mg分1

9日目 イメンドカプセル80mg分1、デカドロン錠8mg分2

10日目 イメンドカプセル80mg分1、デカドロン錠8mg分2

11日目 デカドロン錠8mg分2

※S-1の用量について

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25m <sup>2</sup> 以上～1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

なお、患者の状態により適宜増減する。増減量の段階を 40mg、50mg、60mg、75mg/回とする。増量は本剤の投与によると判断される臨床検査値異常(血液検査、肝・腎機能検査)及び消化器症状が発現せず、安全性に問題がなく、増量できると判断される場合に初回基準量から一段階までとし、75mg/回を限度とする。