

SPH(S-1・シスプラチン・ハーセプチン)療法

SPH療法の投与スケジュール	3週間		
	1日目	8日目	15日目
ハーセプチン（注射）	●		
シスプラチン（注射）	●		
S-1（内服）	1日2回 40mg/m ² /回 2投1休 (14日間服用、7日間休薬)		

3週間ごとに繰り返します。

制吐対策(高度催吐性リスク)

- 1日目 カイトリル注、デカドロン注、イメンドカプセル125mg分1
- 2日目 イメンドカプセル80mg分1、デカドロン錠8mg分2
- 3日目 イメンドカプセル80mg分1、デカドロン錠8mg分2
- 4日目 デカドロン錠8mg分2

※S-1の用量について

体表面積	初回基準量(テガフル相当量)
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

なお、患者の状態により適宜増減する。増減量の段階を 40mg、50mg、60mg、75mg/回とする。増量は本剤の投与によると判断される臨床検査値異常(血液検査、肝・腎機能検査)及び消化器症状が発現せず、安全性に問題がなく、増量できると判断される場合に初回基準量から一段階までとし、75mg/回を限度とする。