

乳がん高度検診・治療センター

NEW-す No.124

新たな分子標的薬

初のAKT阻害薬「トルカプ®」の登場！

エーケーティー

ホルモン受容体陽性HER2陰性の進行再発乳がん患者さんに、新たな治療選択肢が増えました。2024年3月末に保険承認を得たトルカプ®(カピバセルチブ)です！トルカプ®は、AKT阻害薬という分子標的薬の一つで、ホルモン療法であるフェソロテックス®(フルベストラント)と併用して使う、内服のお薬です。

エーケーティー

AKT阻害薬とは？




乳がんには様々な増殖経路(がんが増える仕組み)がありますが、その代表が

ピーアイスリーケー-エーケーティー-エムトール

PI3K-AKT-mTOR経路です。

ホルモン療法を行った後の患者さんでは30-40%の方にこの経路の異常があり、トルカプ®はそこを狙ってがんの増殖を抑える働きをします。

PI3K-AKT-mTOR経路 (簡略図)



トルカプ®を使うのは
こんな患者さん！

ホルモン療法を
すでに使ったこと
がある方

ホルモン受容体陽性
HER2陰性
進行再発乳がんの方

がん遺伝子パネル検査で
PI3K-AKT-mTOR経路
の異常が見つかった方



☆がん遺伝子パネル検査については、次号のセンターニュース(No.125)で取り上げます。ぜひご参照ください！

トルカプ®の飲み方と副作用



飲み方:1日2回、4日間連続で飲み3日間休みます
分かりやすくお薬シートが工夫されていますが
曜日で覚えるのもよいですね！

副作用:皮疹や下痢、高血糖などがあります。

困ったことや分からないこと
があれば、担当医や薬剤師さ
ん、看護師さんなどスタッフに
お声がけくださいね。



市立貝塚病院 乳腺外科 大城 智弥
Kaizuka City Hospital