

# 乳がん高度検診・治療センター

## NEW-す No.131

その2

### 新たな抗体薬物複合体「ダトロウェイ®」の登場

#### ～投与方法と副作用～

前回は、抗体薬物複合体のおさらいとダトロウェイ®について、今回はダトロウェイ®の投与方法や注意すべき副作用について紹介します。

#### ダトロウェイ®の投与方法（スケジュール）

3週間に1回、静脈から点滴で投与します。初回は90分かけて投与し、無理なく実施できた場合、2回目以降は投与時間が30分に短縮可能です。

#### ダトロウェイ®の主な副作用

##### 主な副作用

一般的な抗がん剤と比較して副作用は軽減されていますが、全く副作用がないわけではありません。主な副作用として右記のものがあります。

- 角膜障害、ドライアイ
- 口内炎
- 骨髄抑制（白血球や赤血球、血小板の数が減る）
- 間質性肺炎
- 吐き気
- 倦怠感
- 脱毛など

この中でも、臨床試験において発生頻度が高いと報告されているのが、**角膜\*障害（14.4%）**と、**口内炎（50%）**です。主な症状、予防・軽減のためのセルフケアとして以下のようなものがあります。

※角膜とは？ 黒目の表面の透明な膜で、外的刺激や異物から眼を保護する機能があり、通常涙で覆われています。

#### セルフケア

	角膜障害	口内炎
主な症状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・眼がゴロゴロする、痛い</li> <li>・物が見えづらい</li> <li>・眼が乾燥する・涙の量が増える</li> <li>・いつもよりまぶしく感じる</li> <li>・眼が充血する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・唇や口の中に</li> <li>・痛みがあり食事しづらい</li> <li>・違和感（ガサガサ・ゴワゴワ）がある</li> <li>・赤みやただれ、腫れがある</li> <li>・血がにじむことがある</li> </ul>
基本のケア	<p>①点眼（6回程度/日） →眼のうるおいを保ち、眼へ移行したダトロウェイ®の成分を洗い流す。</p> <p>②コンタクトレンズの使用を控える →眼の表面に刺激やキズを与えない。</p>	<p>①歯磨き（2～3回/日） →口の中を清潔に。やわらかい歯ブラシやデンタルフロス等でていねいに。</p> <p>②うがい（4回以上/日） →口腔粘膜の乾燥を予防し潤いを保つ。1回1分を目安に。水道水や生理食塩水（アルコールを含まないがい液）で。</p>
その他注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコンやスマートフォンの長時間使用を控える</li> <li>・部屋の湿度を保つ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・刺激の強い食べ物、お酒やタバコを控える</li> <li>・加湿器やマスクで就寝中の口腔内乾燥予防</li> </ul>

ダトロウェイ®の治療を受ける患者様向けに、角膜障害および口内炎予防を目的としたスターターキットの案内を行っています。何かご質問がありましたら、いつでもスタッフにお尋ねください。